

Hans Walser, [20140817]

Additionstheorem für Verhältnisse im Dreieck

Herkunft: R., B.

1 Das Theorem

Die Abbildung 1 zeigt die geometrische Situation:




Abb. 1: Situation

Mit den Bezeichnungen der Abbildung 1 gilt:

$$\frac{e}{f} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

2 Beweisskizze

Die Aussage des Theorems ist affin invariant. Wir können daher mit dem Dreieck der Abbildung 2 arbeiten.




Abb. 2: Beweisfigur

Für den Schnittpunkt S erhalten wir mit einiger Rechnung die Koordinaten:

$$S = \left(\frac{ad(a+b)}{ad+bc+bd}, \frac{bc(c+d)}{ad+bc+bd} \right)$$

vom Punkt R benötigen wir nur die x -Koordinate:

$$x_R = \frac{ad(a+b)}{ad+bc}$$

Es ist dann:

$$\frac{e+f}{e} = \frac{x_R}{x_S} = \frac{ad+bc+bd}{ad+bc}$$

$$1 + \frac{f}{e} = 1 + \frac{bd}{ad+bc}$$

Somit ist:

$$\frac{f}{e} = \frac{bd}{ad+bc}$$

$$\frac{e}{f} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

3 Eine Ungleichung

Wir verwenden die Bezeichnungen der Abbildung 3.




Abb. 3: Bezeichnungen

Dreimalige Anwendung des Additionstheorems liefert:

$$\frac{e_0}{f_0} + \frac{e_1}{f_1} + \frac{e_2}{f_2} = \left(\frac{a_{2,0}}{a_{2,1}} + \frac{a_{1,0}}{a_{1,2}} \right) + \left(\frac{a_{0,1}}{a_{0,2}} + \frac{a_{2,1}}{a_{2,0}} \right) + \left(\frac{a_{1,2}}{a_{1,0}} + \frac{a_{0,2}}{a_{0,1}} \right)$$

$$= \underbrace{\frac{a_{0,1}}{a_{0,2}} + \frac{a_{0,2}}{a_{0,1}}}_{\geq 2} + \underbrace{\frac{a_{1,2}}{a_{1,0}} + \frac{a_{1,0}}{a_{1,2}}}_{\geq 2} + \underbrace{\frac{a_{2,0}}{a_{2,1}} + \frac{a_{2,1}}{a_{2,0}}}_{\geq 2} \geq 6$$

Gleichheit gilt genau dann, wenn S der Schwerpunkt ist.

4 Bemerkung

Das Theorem erinnert von ferne an den Satz von Ceva. Allerdings sind im Satz von Ceva die relevanten Verhältnisse *multiplikativ* verbunden.